

École *LPP*

**Lettre aux élèves de 14 -16 ans et à leurs parents**

Objet : Information sur la mise à jour de la vaccination

Chers parents, étudiants et étudiantes,

Au Québec, l'âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans. Votre enfant est donc en mesure de consentir lui-même à la vaccination offerte à l'école. Les présentes informations vous sont donc fournies afin que vous puissiez le soutenir dans sa démarche.

La vaccination aura lieu à l'école le 7, 8, 9 oct. 2019

La 2<sup>e</sup> vaccination, pour les élèves concernés seulement, aura lieu à l'école le 10 & 11 Mars 2020  
**Deux vaccins offerts à tous les élèves**

Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos est recommandé à votre enfant pour le protéger contre ces 2 maladies. La diphtérie et le tétanos sont des maladies sérieuses causées par des bactéries. Il est important de faire vacciner les jeunes pour conserver la protection.

Le vaccin contre le méningocoque de séro groupe C protège des infections graves comme la méningite et l'infection du sang. Une dose à l'adolescence est recommandée à tous.

**Mise à jour de la vaccination**

De plus, l'infirmière vérifiera le carnet de vaccination de votre enfant et s'assurera qu'il a reçu toutes les doses de vaccins indiqués pour son âge contre les maladies suivantes : diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle (picote), hépatite B et les VPH. Elle pourra lui donner les vaccins manquants afin qu'il soit bien protégé.

**Depuis septembre 2016**

**VPH offert aux garçons**

Le vaccin VPH sera offert à tous les garçons de secondaire 3 ainsi qu'aux filles qui n'auraient pas reçu 2 doses du vaccin en 4<sup>e</sup> année.

Le virus du papillome humain (VPH) est parmi les virus les plus répandus dans le monde et ils sont très nombreux. On en compte plus de 100. Certains VPH peuvent causer des condylomes (verrues anales ou génitales), des lésions précancéreuses aux organes génitaux et au col de l'utérus ainsi que les cancers du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du pénis, de l'anus et de la gorge.

Pour plus d'information sur ces vaccins et la vaccination en général, consultez ces adresses internet ;

- Gouvernement du Québec : [Quebec.ca/vaccination](http://Quebec.ca/vaccination)
- Agence de santé publique du Canada : [www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/faq-fra.php#vph](http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/faq-fra.php#vph)
- Société des obstétriciens-gynécologues du Canada : [www.infovph.ca/](http://www.infovph.ca/)

Nous vous demandons de :

1. **Remplir les deux premières sections du formulaire ci-joint (identification et renseignements médicaux) si ce n'est pas déjà fait en classe;**
2. **Dès demain, retourner le formulaire à l'école, s'il n'a pas déjà été remis.**

Lors de la journée de vaccination, il est préférable de bien s'alimenter, porter un vêtement à manches courtes et il est **très important d'apporter le carnet de vaccination.**

En cas d'absence lors de la vaccination, il faudra prendre un rendez-vous à la centrale de rendez-vous du  
CLSC Châteauguay au 450-699-3333  
CLSC Kateri au 450-659-7661  
CLSC Jardins-du-Québec au 450-454-4671

Nous vous remercions de votre collaboration.

Diane Caron  
Infirmière Clinicienne  
Téléphone: 450-699-3333 Poste : 3512

Maladies	Signes et symptômes	Complications possibles	La vaccination	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Diphthérie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maux de gorge importants</li> <li>Forté fièvre</li> <li>Problèmes respiratoires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problèmes cardiaques</li> <li>Paralytie</li> <li>Décès (5 à 10 % des cas)</li> </ul>	<p>Vaccin DT :</p> <p>Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>Fatigue, mal de tête</li> </ul>	
Tétanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spasmes musculaires de la mâchoire</li> <li>Spasmes des cordes vocales</li> <li>Spasmes musculaires de tout le corps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problèmes respiratoires et cardiaques</li> <li>Décès (10 à 80 % des cas)</li> </ul>	<p>Très souvent (Moins de 50 % des gens)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>Malaises, étourdissements, nausées, diarrhée, frissons</li> </ul>	
Le vaccin protège contre la méningite de sérogruppe C	<p>La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dommmages permanents au cerveau</li> <li>Amputation des mains ou des pieds (10 à 15 % des cas)</li> <li>Décès (10 à 15 % des cas)</li> </ul>	<p>Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> </ul>
Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque entre autres les sérogroupes A, B, C, W et Y.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forté fièvre</li> <li>Mal de tête important</li> <li>Nausées et vomissements</li> <li>Atteinte de l'état général</li> <li>Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau</li> </ul>		<p>Très souvent (moins de 50 % des gens)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rougeur et gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>Fièvre, somnolence et irritabilité, surtout chez les enfants âgés de moins de 5 ans</li> <li>Mal de tête, malaise, douleur musculaire et douleur aux jointures, surtout chez les personnes âgées de 11 ans et plus</li> <li>Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li> </ul>
Infections par les VPH (Virus du papillome humain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vernes anales et génitales (environ 14 000 cas par année au Québec avant le début de la vaccination)</li> <li>Lésions précancéreuses du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du pénis, de l'anus ou de la gorge si l'infection persiste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancer du col de l'utérus (environ 280 cas par année au Québec)</li> <li>Cancers du vagin, de la vulve, du pénis ou de l'anus (environ 115 cas par année au Québec)</li> <li>Cancers de la gorge (environ 185 cas par année au Québec)</li> <li>Décès (le cancer du col de l'utérus cause environ 70 décès par année au Québec)</li> </ul>	<p>Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)</p> <p>Très souvent (moins de 50 % des gens)</p> <p>Souvent (moins de 10 % des gens)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>Rougeur ou gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>Démangeaisons à l'endroit où l'injection a été faite, fièvre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le vaccin Cervarix cause un peu plus de douleur, de rougeur et de gonflement à l'endroit où l'injection a été faite que Gardasil-9.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête)</li> <li>✓ Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.</li> </ul>					

Extrait : <http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/vaccination-immunisation>